

ИЗРАБОТКА НА ВАГИТОРИИ

Rp/

Acidi lactici vagitoria

M.f. Vag. N° X

S. 1 вагиторија навечер во вагина

Изработка:	<u>1 vagit.</u>	<u>10 vagit.</u>
Acidum lacticum	0,18g	2.16g
Gelatina alba	0,35g	4,20g
Glycerolum	1,76g	21,12g
Aqua purificata	0,71g	8,52g

Желатината се кваси со вода, се остава 15 минути да бабри, и со загревање се раствора на водена пареа. Посебно се загрева глицеролот на водена пареа и се помешува со желатината. Млечната киселина постепено се додава на глицерол-желатинската смеса, и топлата смеса, со мешање, се излева во подготвен калап. 1 ml млечна киселина одговара на 1,2 g.

Дејство и употреба: вагиториите со млечна киселина ја коригираат рН вредноста на вагиналниот секрет. Се става една вагиторија навечер.

Rp/

Acidi pipemidici vagitoria

M.f. Vag. N° X

S. 1 вагиторија навечер во вагина

Изработка:	<u>1 vagit.</u>	<u>10 vagit.</u>
Acidum pipemidicum	0,2g	2,4g
Adeps solidus	2,8g	34,32g

На иситнетата пипемидинска киселина со постојано мешање се додава растопената подлога. Хомогената смеса со соодветна конзистенција со постојано мешање се излева во подготвен калап.

Дејство и употреба: антисептик. Се става една вагиторија навечер.

Rp/

Hyperici olei vagitoria

M.f. Vag. N° X

S. 1 вагиторија навечер во вагина

Фармацевтска технологија за III година

- практична настава -

Изработка:	<u>1 vagit.</u>	<u>10 vagit.</u>
Hyperici oleum	0,90g	10,80g
Cera alba	0,15g	1,8g
Adeps solidus	1,95g	23,4g

Витепсолот и белиот восок се топат на водена пара на 38-40°C. Со постојано мешање им се додава кантарионовото масло. Хомогената маса со постојано мешање се излева во претходно подготвен калап.

Дејство и употреба: антифлогистик, епителизанс. Се става една вагиторија навечер.

Rp/

Ampicillini vagitoria

	<u>1 vagit.</u>	<u>10 vagit.</u>
Ampicillinum trihydratum	0,5g	6,0g
Adeps solidus	2,5g	31,8g

Rp/

Cephalexini vagitoria

	<u>1 vagit.</u>	<u>10 vagit.</u>
Cephalexinum	0,5g	6,0g
Adeps solidus	2,5g	31,8g

Rp/

Clindamycini chloridi vagitoria

	<u>1 vagit.</u>	<u>10 vagit.</u>
Clindamycini chloridum	0,10g	1,20g
Adeps solidus	2,90g	35,16g

Rp/

Metronidazoli vagitoria

	<u>1 vagit.</u>	<u>10 vagit.</u>
Metronidazolum	0,5g	6,0g
Adeps solidus	2,5g	31,8g

Rp/

Nystatini vagitoria

	<u>1 vagit.</u>	<u>10 vagit.</u>
Nystatinum	0,017g	0,204g
Macrogolum 400	1,193g	14,342g
Macrogolum 4000	1,790g	21,514g