

СИФИЛИС

(TREPONEMA PALIDUM)



Предизвикувач на сифилис – *TREPONEMA PALIDUM*

Вовед:


- **Сифилисот** (Lues) е хронично инфективно заболување, предизвикано од бактеријата *Treponema pallidum*. Според начинот на пренесување тој може да биде стекнат и вроден. Стекнат сифилис се пренесува со полов контакт. Извор на инфекцијата е заболен човек, а влезна врата е кожата и лигавицата на гениталните органи.


- Сифилисот е болест која се одвива во три стадиуми, означени како примарен, секундарен и терцијален стадиум.
- **Примарен стадиум:** Примарниот стадиум се јавува 2-8 недели по инфекцијата. Локално на гениталната регија се јавува тврда чанка, која улцерира и се формира *ulcus durum*, безболна раничка, од која се излучува секрет. За 4-6 недели спонтано се повлекува, оставајќи мала лузна.



БЕЗБОЛНА РАНИЧКА ОД КОЈА СЕ
ИЗЛАЧУВА СЕКРЕТ

- **Секундарен стадиум:** Секундарниот се јавува кај една третина од нелекуваните пациенти и тоа 2-8 недели по појавата на примарната инфекција. Ова е најзаразниот стадиум на сифилис, и се јавува како резултат на навлегување на бактеријата во крвта. Се карактеризира со кожен исип во вид на црвени, кафеави дамки, папули или гнојни меурчиња по телото, дланките, табаните и лицето. Во устата, грлото или гениталните органи се јавуваат црвени дамки со плитки улцерации. Лимфните жлезди се зголемени, покачена е телесната температура, се јавуваат болки во коските, зглобовите и др. Оваа фаза поминува за неколку недели до една година, преминувајќи во латентна фаза – фаза без симптоми.





- **Терциерен стадиум:** Терциерниот стадиум е крајна фаза на сифилис кај нелекуваните болни, се јавува после 6 месеци до неколку години од примарната инфекција. Карактеристично за овој стадиум е формирањето на гуми и дифузна фиброза. Гуми се јазлести формации со големина на зрно просо или поголеми до неколку сантиметри, а се јавуваат во црниот дроб, коските, зглобовите, централниот нервен систем и др. Фиброзата е размножување на сврзно ткиво во малите крвните садови како и на аортата.

- **Последици на сифилис се оштетување на мозокот, видот и слухот, оштетување на аортата, коските, зглобовите и сите други органи зафатени во терцијалниот стадиум. Со навремено откривање на сифилисот и негово лекување со антибиотска терапија се спречуваат потешките последици од ова заболување!**



Вроден сифилис

- Вроден сифилис е кога се пренесе за време на бременоста, од мајката на плодот. Во случај мајката да има сифилис и тоа прв или втор стадиум, плодот се инфицира преку плацентата, и често пати резултира со прекин на бременоста (абортус) или интраутерина смрт на плодот пред раѓањето.



- Доколку не дојде до интраутерина смрт детето може по раѓањето да има рани или касни знаци на сифилис. Знаци на сифилис кај детето се промени на кожата и лигавиците како од секундарниот стадиум, карактеристична слика е “седласт нос”, тибиијата е свиткана и наречена “сабјеста подколоница”, черепот има коцкеста форма, забите се деформирани, се јавуваат гуми и фиброза во внатрешните органи и се јавува глувост, слепило и др.

Превенирај!

- Превенцијата се однесува на избегнување на полови контакти со непознати, ризични или заболени лица. Редовни систематски прегледи и лекарска контрола при секоја промена на телото и знак за постоење на болест или инфекција, за да може на време да се открие инфекцијата и да се спречи понатамошното заболување и компликации.

Заштити се !

